

附件 3（略）

附件 4（略）

附件 5

说明书和标签

一、兔病毒性出血症杆状病毒载体二价灭活疫苗(HP1-VP60 株+HP2-VP60 株)说明书和标签

(一)兔病毒性出血症杆状病毒载体二价灭活疫苗(HP1-VP60 株+HP2-VP60 株)说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 兔病毒性出血症杆状病毒载体二价灭活疫苗(HP1-VP60 株+HP2-VP60 株)

商品名 无

汉语拼音 Tu Bingduxingchuxuezheng Ganzhuangbingduzaiti Erjia Miehuoyimiao (HP1-VP60 Zhu+HP2-VP60 Zhu)

英文名 Rabbit Hemorrhagic Disease Baculovirus Vector Bivalent Vaccine, Inactivated (Strain HP1-VP60+ Strain HP2-VP60)

【主要成分与含量】 疫苗中含有灭活的兔病毒性出血症 1 型重组杆状病毒 HP1-VP60 株、兔病毒性出血症 2 型重组杆状病毒 HP2-VP60 株,两种抗原的血凝价均为 1:256。

【性状】 静置后,上层为无色或淡黄色澄清液体,下层为浅白色沉淀,振荡后呈浅白色或淡黄色均匀混悬液。

【作用与用途】 用于预防兔病毒性出血症 1 型和 2 型感染,接种后 14 日产生免疫力,免疫期为 6 个月。

【用法与用量】 皮下注射。30 日龄以上的健康兔,每只 1.0ml。

【不良反应】 部分兔注射后可能出现一过性食欲减退的现象。

【注意事项】 (1)未使用过本疫苗的地区,应先小范围试用,观察 3~5 日,证明确实安全后才可以使

(2)紧急预防接种时应先在疫区周围使用,再到疫区使用。

(3)本品应在规定条件下保存,严防冻结。冻结过的疫苗禁用。

(4)疫苗过期、变色或疫苗瓶破损均不得使用。

(5)疫苗应恢复至常温使用,使用前及使用过程中均应充分摇匀。

(6)针头、注射器应灭菌,注射部位应消毒,每只兔子应更换针头。

(7)疫苗开封后须 4 个小时内用完。

(8)用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】

【包装】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为18个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 兔病毒性出血症杆状病毒载体二价灭活疫苗 (HP1-VP60 株+HP2-VP60 株) 标签

兽用

兔病毒性出血症杆状病毒载体二价灭活疫苗 (HP1-VP60 株+HP2-VP60 株)

批准文号:

批 号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防兔病毒性出血症1型和2型感染，接种后14日产生免疫力，免疫期为6个月。

【用法与用量】 皮下注射。30日龄以上的健康兔，每只1.0ml。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为18个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

二、猪圆环病毒1-2型嵌合体、支原体肺炎二联灭活疫苗说明书和标签

(一) 猪圆环病毒1-2型嵌合体、支原体肺炎二联灭活疫苗说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 猪圆环病毒1-2型嵌合体、支原体肺炎二联灭活疫苗

商品名称 无

英文名称 Porcine Circovirus Vaccine, Type1-Type 2 Chimera, Killed Virus, Mycoplasma

Hyopneumoniae Bacterin

汉语拼音 Zhu Yuanhuanbingdu Yi-er Xing Qianheti , Zhiyuantifeiyan Erlian Miehuoyimiao

【主要成分与含量】 每头份疫苗中含有猪圆环病毒1-2型嵌合体和猪肺炎支原体 (P-5722-3株) 抗原相对效力 (RP值) 不低于1.0。

【性状】 淡粉色至灰白色至浅褐色溶液。

【作用与用途】 用于预防猪圆环病毒2型引起的感染和猪支原体肺炎。接种后3周产生免疫力。免疫期为23周。

【用法与用量】 肌肉注射。用于3周龄或3周龄以上的健康猪，每头猪2ml。

【不良反应】 很少发生过敏反应，必要时使用肾上腺素等脱敏措施抢救。

- 【注意事项】** (1) 仅用于接种健康猪。
- (2) 切忌冻结。
 - (3) 使用前摇匀，接种时注意无菌操作。
 - (4) 疫苗开封后，应一次用完。
 - (5) 屠宰前21日内禁用。
 - (6) 疫苗中含有庆大霉素和硫柳汞。
 - (7) 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为24个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅在兽医指导下使用

(二) 猪圆环病毒 1-2 型嵌合体、支原体肺炎二联灭活疫苗标签

兽用

猪圆环病毒1-2型嵌合体、支原体肺炎二联灭活疫苗

批准文号：

批 号：

有效期至：

【作用与用途】 用于预防猪圆环病毒 2 型引起的感染和猪支原体肺炎。接种后 3 周产生免疫力。免疫期为 23 周。

【用法与用量】 肌肉注射。用于3周龄或3周龄以上的健康猪，每头猪2ml。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为24个月。

【生产企业】

仅在兽医指导下使用